



## Aktualności

### Najnowsze informacje o HPV

## Badania cytologiczne wśród Polek

Jedynie 30 procent dorosłych Polek ma wykonywane badanie cytologiczne

Badanie cytologiczne tzw. test Pap (zwany również rozmazem Pap) jest prostym badaniem - zazwyczaj przeprowadzanym w gabinecie lekarskim lub w klinice - które pozwala na wykrycie atypowych komórek w obrębie szyjki macicy <sup>[20]</sup>.

Badanie cytologiczne wykrywa zmiany w obrębie szyjki macicy, zanim nabiorą one charakteru nowotworowego <sup>[21]</sup>. Jego stosowanie w znaczący sposób ograniczyło ilość zgonów z powodu raka szyjki macicy po jego wprowadzeniu w latach 50. XX wieku <sup>[22]</sup>. Pomiędzy 1950, a 1970 liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy na terenie USA obniżyła się o 70% <sup>[23]</sup>. Natomiast w Polsce, w stosunku do lat 60-tych, liczba zgonów wzrosła prawie dwukrotnie.

Każdego roku na terenie USA badania cytologiczne (Pap) pozwalają wykryć 3,5 miliona kobiet ze zmianami, które wymagają dalszej diagnostyki <sup>[24]</sup>.

W Polsce rutynowym cytologicznym badaniem przesiewowym poddaje się jedynie od 20 do 35% Polek w wieku skriningowym (30-59 lat).

Podobnie jak inne testy medyczne, badanie cytologiczne Pap nie jest doskonałe <sup>[25]</sup>. Czasami nie ujawnia zmian w obrębie szyjki macicy, podczas gdy w rzeczywistości one istnieją - jednakże regularne badania przesiewowe pomagają kobietom i ich lekarzom w korekcie tych "fałszywie negatywnych" wyników <sup>[26]</sup>.

Zobacz więcej na [www.hpv.pl](http://www.hpv.pl)